11063-1_bookart.qxd 12/18/06 10:18 AM Page 1

## DIRECTIONS FOR USE

### GENERAL INFORMATION

ELEVATE® 50 WDG Fungicide is a cyclohexanecarboxamide protectant fungicide used for the control of Gray mold, *Botrytis cinerea*, on blackberries, grapes, loganberries, raspberries (red and black) and strawberries. This product should be used in a program with other products to provide season-long protection. Apply as a spray with ground equipment, using sufficient water to obtain thorough coverage of plants. Dense foliage or excessive growth will often prevent adequate coverage; adjust spray volumes accordingly. Do not replant food crops other than those for which the product is labelled within 30 days following the last application.

### RESISTANCE MANAGEMENT

For resistance management, please note that ELEVATE 50 WDG contains a Group 17 fungicide. Any fungal population may contain individuals naturally resistant to ELEVATE 50 WDG and other Group 17 fungicides. A gradual or total loss of pest control may occur over time if these fungicides are used repeatedly in the same fields. Other resistance mechanisms that are not linked to site of action but specific for individual chemicals, such as enhanced metabolism, may also exist. Appropiate resistance-management strategies should be followed.

To delay fungicide resistance:

- Where possible, rotate the use of ELEVATE 50 WDG or other Group 17 fungicides with different groups that control the same pathogens. Avoid application of more than 2 consecutive sprays of ELEVATE 50 WDG or other fungicides in the same group in a season.
- Use tank mixtures with fungicide/bactericides from a different group when such use is permitted.
- Fungicide use should be based on an IPM program that includes scouting, historical information related to pesticide use and crop rotation and considers cultural, biological and other chemical control practices.
- Monitor treated fungal populations for resistance development.
- If disease continues to progress after treatment with this product, do not increase the use rate. Discontinue use of this product, and switch to another fungicide with a different target site of action, if available.
- Contact your local extension specialist or certified crop advisors for any additional pesticide resistance-management and/or IPM recommendations for specific crops and pathogens.
- For further information and to report suspected resistance, contact ARYSTA LIFESCIENCE NORTH AMERICA CORPORATION at 1-866-761-9397.

### MIXING DIRECTIONS

Begin with clean equipment. Add sufficient clean water to the spray tank for one-half of the mix load. Start tank agitation. Agitate to ensure thorough mixing while adding the appropriate amount of ELEVATE 50 WDG Fungicide and the remaining required water. This product should be properly suspended and diluted prior to the addition of AGRAL® 90 in grapes. Maintain agitation during mixing and application. DO NOT allow the spray mixture to stand without agitation. Apply with properly calibrated spray equipment. If agitation is stopped for any reason, the spray solution must be thoroughly re-mixed prior to any further use.

### APPLICATION

Prepare only the amount of spray solution needed to treat the area to be sprayed. Maintain agitation during application. Applications should be made immediately after the spray solution is prepared. If there is any delay in application, continue mix agitation. Do not allow the spray mixture to stand without agitation. If agitation is stopped for any reason, the spray solution must be thoroughly re-mixed prior to any further use. Do not apply if rainfall is expected within 6 hours after application. Do not use overhead irrigation within 6 hours after application.

Apply using ground equipment only (such as boom type, air blast, hand gun or mist blower sprayers).

DO NOT apply this product through any type of irrigation system.

Thorough coverage of all flowers and fruiting parts is essential for control of blossom and fruit infections caused by *Botrytis*.

Proper calibration and operation of spray equipment is essential for successful spraying. Consult the spray equipment manufacturer's operators manual, spray nozzle catalogs, and/or your crop advisor for more information.

### APPLICATION RATES

Carefully read and understand the following label for use information and restrictions.

### GRAPES

For the control of *Botrytis* bunch rot (Gray mold) on grapes, apply 1.12 kg product per hectare (0.56 kg AI/hectare) tank mixed with AGRAL® 90 at 0.02% v/v prior to disease establishment when conditions favour disease development at early bloom, bunch preclosure, veraison (beginning of fruit ripening) to two weeks after veraison, and the final application up to 7 days of harvest (PHI=7 days). For the additional control of powdery mildew and blackrot ELEVATE 50 WDG may be tankmixed with NOVA® 40W when conditions favour disease development. Consult the NOVA 40W label for the appropriate application rates. DO NOT make more than 3 applications per season. DO NOT apply more than 3.4 kg of product per hectare per year (1.7 kg AI/hectare/year).

### RASPBERRIES (red and black), LOGANBERRIES and BLACKBERRIES

For the control of *Botrytis cinerea* (Gray Mold) on red and black raspberries, loganberries and blackberries, apply 1.7 kg product per hectare (0.85 kg AI/hectare) as a foliar spray. Begin application at 10% bloom and continue up to 1 day prior to harvest (PHI = 1 day). Applications should be made every 7 days or when conditions favour disease development. DO NOT make more than 4 applications per year. Ground applications only. DO NOT apply more than 6.8 kg product per hectare per year (3.4 kg AI/hectare/year).

### STRAWBERRIES

For the control of *Botrytis cinerea* (Gray mold) on strawberries, apply 1.7 kg product per hectare (0.85 kg AI/hectare) beginning prior to disease establishment and no later than 10% bloom, and continue applications every 7 to 14 days or when conditions favour disease development. For *Botrytis* and leaf spot control ELEVATE 50 WDG Fungicide may be applied in a tank mix at a rate of 1.20 to 1.7 kg product per hectare (0.56 to 0.85 kg AI/hectare) with the recommended rate of MAESTRO® 80DF. DO NOT make more than 4 applications per season. The final application may be made up to 1 day prior to harvest (PHI = 1 day). DO NOT apply more than 6.8 kilograms product per hectare per year (3.4 kg AI/hectare/year).

### PRECAUTIONS

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** DO NOT reenter treated area within 4 hours of application. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Wash concentrate from skin or eyes immediately. Do not inhale fumes. Avoid breathing vapors or spray mist. After use wash hands and other exposed skin. When using do not eat, drink or smoke. Remove and launder contaminated clothing separately from household laundry before reuse. Avoid spray drift. Avoid contamination of ponds, streams, rivers and desirable vegetation. Store the container tightly closed and away from seeds, feeds, fertilizer, plants and foodstuffs. Observe appropriate provincial buffer zones around bodies of water and wetland area. Wear long sleeved shirt and long pants during all activities. In addition, wear chemical resistant gloves during mixing, loading, cleanup and repair activities.

If this pest control product is to be used on a commodity that may be exported to the U.S. and you require information on acceptable residue levels in the U. S., contact 1-866-375-4648 or www.cropro.org

### FIRST AID

Remove person from contaminated area; remove contaminated clothing. Keep patient warm, comfortable, and at rest.

**Eye Contact:** Flush with plenty of water. Call a physician if irritation persists.

**Skin Contact:** Wash with plenty of soap and water. Get medical attention if irritation persists.

**Ingestion:** Call a physician or Poison Control Center **IMMEDIATELY**. Drink 1 to 2 glasses of water and induce vomiting by touching the back of the throat with finger, or if available, by administering syrup of ipecac. If person is unconscious, do not give anything by mouth and do not induce vomiting.

Take container, label or product name and Pest Control Product Registration number with you when seeking medical attention.

**FOR 24-HOUR MEDICAL EMERGENCY ASSISTANCE CALL 1-800-228-5635, Ext. 174.**

**TOXICOLOGICAL INFORMATION:** Treat symptomatically.

### ENVIRONMENTAL PRECAUTIONS

This product is toxic to fish and other aquatic organisms. Do not contaminate aquatic areas, including lakes, rivers, sloughs, ponds, coulees, prairie potholes, creeks, marshes, streams, reservoirs, wetlands, and marine/estuarine habitats through overspray, cleaning of equipment and containers, or disposal of waste.

When a tank mixture is used, consult the label of the tank-mix partners and observe the largest (most restrictive) buffer zone of the products involved in the tank mixture.

For application by airblast/vineyard sprayers:

Do not direct spray above trees/vines and turn off outward pointing nozzles at row ends and outer rows. Do not apply during periods of dead calm, when winds are gusty or when wind speed is greater than 16 km/hr at the application site as measured outside of the orchard/vineyard on the upwind side.

For the protection of non-target habitats, overspray or drift to sensitive habitats must be avoided. A buffer zone of 7 metres is required between the downwind point of direct application and the closest edge of sensitive aquatic habitats such as lakes, rivers, sloughs, ponds, coulees, prairie potholes, creeks, marshes, streams, reservoirs, and wetlands.

**STORAGE:** May be stored at ambient temperature. Keep in original container. This product should not be stored under extreme temperatures. To close package, make sure the package is folded to form an airtight seal and store under dry conditions. Insecticides and fungicides should be segregated from herbicides to prevent the possibility of cross-contamination.

**SPILL HANDLING:** Clean up spill immediately. Place product and any contaminated cleanup materials in a chemical waste container. Wash area with soap and water. Pick up wash liquid with additional absorbent and place in a disposable container.

**FOR 24-HOUR CHEMICAL EMERGENCY (Spills, Leak, Fire, Exposure, or Accident) ASSISTANCE, CALL CHEMTREC 1-800-424-9300.**

**DISPOSAL:** Rinse the emptied container thoroughly and add rinsings to the spray mixture in the tank. Follow provincial instructions for any required additional cleaning of the container prior to its disposal. Make the empty container unsuitable for further use. Dispose of the container in accordance with provincial requirements. For information on the disposal of the unused, unwanted product contact the manufacturer or the provincial regulatory agency. Contact the manufacturer and the provincial regulatory agency in case of a spill and for clean up of spills.

### NOTICE TO USER

This control product is to be used only in accordance with the Directions for Use on this label. It is an offence under the Pest Control Products Act to use a control product under unsafe conditions.

### NOTICE TO BUYER

Seller's guarantee shall be limited to the terms set out on the label and, subject thereto, the buyer assumes the risk to persons or property arising from the use or handling of this product and accepts the product on that condition.

Fenhexamid was invented and is produced by Bayer AG, Germany.

ELEVATE® Registered Trademark of Arysta Lifescience North America Corporation
AGRAL® Registered Trademark of Syngenta
MAESTRO® Registered Trademark of Arysta LifeScience North America Corporation
NOVA® Registered Trademark of Rohm and Haas Company, USA

## MODE D'EMPLOI

### RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Le fongicide ELEVATE® 50 WDG est un fongicide protecteur au cyclohexanecarboxamide pour supprimer la moisissure grise, *Botrytis cinerea* dans les mûres sauvages (de ronces), le raisin, les mûres de Logan, les framboises rouges et noire, et les fraises. Utiliser ce produit dans un programme d'arrosage avec d'autres produits pour protéger pendant toute la saison. Appliquer en pulvérisation avec un équipement terrestre, et utiliser suffisamment d'eau pour couvrir à fond les plants. Le feuillage dense ou une croissance excessive empêchent souvent de couvrir à fond; ajuster les volumes de pulvérisation en conséquence. Ne pas replanter les cultures vivrières autres que celles pour lesquelles le produit est recommandé sur l'étiquette moins de 30 jours après le dernier traitement.

### GESTION DE LA RÉSISTANCE

Gestion de la résistance, ELEVATE 50 WDG, fongicide du groupe 17. Toute population fongique ou bactérienne peut renfermer des individus naturellement résistants à ELEVATE 50 WDG et à d'autes fongicides du groupe 17. Il peut se produire une perte progressive ou complète d'efficacité lorsque ces fongicides sont appliqués à répétition sur les mêmes champs. Il peut exister d'autres mécanismes de résistance sans lien avec le site ou le mode d'action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suive des stratégies appropriées de gestion de la résistance.

Pour retarder l'acquisition de la résistance aux fongicides:

- Dans la mesure du possible, alterner le ELEVATE 50 WDG ou les fongicides du même groupe 17 avec des fongicides appartenant à d'autres groupes et qui éliminent les mêmes organisms pathogènes. On peut dire, p. ex., d'éviter d'effectuer plus de 2 pulvérisations consécutives de ELEVATE 50 WDG ou d'autres fongicides du même groupe pendant une saison.
- Utiliser des mélanges en cuve contenant des fongicides provenant d'un groupe différent, si cet emploi est permis.
- Utiliser les fongicides dans le cadre d'un programme de lutte intégrée comprenant des inspections sur le terrain, des relevés d'utilisations antérieures de pesticides et sur l'assolement, et faisant place à la possibilité d'intégrer des pratiques de labour (ou d'autres méthodes mécaniques) ou de lutte culturale, biologique, ou d'autres formes de lutte chimique.
- Inspecter les populations fongiques traitées pour y découvrir les signes de l'acquisition d'une résistance.
- Lorsque la maladie continue de progresser après traitment avec ce produit, ne pas augmenter la quantité utilisée. Cesser d'employer le produit et passer à un autre fongicide ayant un site ou un mode d'action différent, si possible.
- Pour des cultures précises ou des organismes nuisibles précis, s'adresser au spécialiste local des interventions sur le terrain ou à un conseiller agréé pour toute autre recommandation relative à la gestion de la résistance aux pesticides ou encore à la lutte intégrée.
- Pour plus d'information ou pour signaler des cas possibles de résistance, s'adresser à ARYSTA LIFESCIENCE NORTH AMERICA CORPORATION au 1-866-761-9397.

### MÉLANGE

S'assurer que l'équipement est propre. Ajouter suffisamment d'eau propre dans la cuve pour la moitié du mélange. Faire fonctionner l'agitateur. Agiter pour mélanger à fond pendant qu'on ajoute la quantité adéquate de fongicide ELEVATE 50 WDG et le reste de l'eau requise. Pour le raisin, ce produit doit être en suspension et bien dilué avant d'ajouter AGRAL® 90. Maintenir l'agitation pendant le mélange et l'application. NE PAS permettre au mélange de pulvérisation de reposer sans agitation. Appliquer à l'aide d'un equipement de pulvérisation adéquatement calibré. S'il faut arrêter l'agitation pour toute raison, mélanger à nouveau la solution de pulvérisation avant de l'utiliser pour tout autre usage.

11063-1_bookart.qxd 12/18/06 10:18 AM Page 2

## APPLICATION

Préparer seulement la quantité de solution de pulvérisation nécessaire pour l'endroit à traiter. Maintenir l'agitation pendant l'application. Appliquer immédiatement après avoir préparé la solution de pulvérisation. S'il faut attendre avant de traiter, continuer d'agiter le mélange. S'il faut arrêter l'agitation pour toute raison, mélanger à nouveau à fond la solution de pulvérisation avant tout autre usage. Ne pas appliquer si une pluie est prévue moins de 6 heures après le traitement. Ne pas utiliser d'irrigation sur frondaison moins de 6 heures après le traitement.

Appliquer seulement avec un équipement terrestre (comme un type à rampe d'aspersion, pneumatique, manuel ou brumisateur).

NE PAS appliquer ce produit à l'aide de tout type de système d'irrigation.

Il est essentiel de couvrir à fond toutes les fleurs et les rameaux porteurs pour protéger contre les infections des fleurs et des fruits causées par le *Botrytis*.

Il est essentiel de bien calibrer et de faire fonctionner adéquatement l'équipement de pulvérisation pour obtenir de bons résultats. Consulter le manuel de l'utilisateur fourni par le fabricant de équipement de pulvérisation, les catalogues de buses, et/ou votre conseiller des cultures pour de plus amples renseignements.

## DOSES D'EMPLOI

Lire attentivement et comprendre les renseignements et restrictions qui figurent sur l'étiquette.

**RAISIN**

De suppression la moisissure grise des grappes (causée par le *Botrytis*) dans le raisin, appliquer 1,12 kg de produit par hectare (0,56 kg IA/hectare) comme mélange en cuve avec AGRAL® 90 à raison de 0,02% v/v avant l'apparition de la maladie. Appliquer lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie au début de la floraison, avant la fermeture de la grappe, à la véraison (début du mûrissement des fruits) jusqu'à deux semaines après la véraison, et le dernier traitement jusqu'à 7 jours avant la récolte (DAAR=7 jours). Pour une suppression supplémentaire du blanc et de la pourriture noire, mélanger en réservoir ELEVATE 50 WDG avec NOVA 40W lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie. Consulter l'étiquette de NOVA 40W pour connaître les doses appropriées. NE PAS faire plus que 3 applications par saison. NE PAS appliquer plus que 3,4 kg de produit par hectare par année (1,7 kg IA/hectare/année).

**LES FRAMBOISES (rouges et noires), LES MÛRES DE LOGAN ET LES MÛRES SAUVAGES (de ronces).**

Pour la suppression du *Botrytis cinerea* (moisissure grise) sur les framboises rouges et noires, les mûres de Logan et les mûres sauvages (de ronces), appliquer 1.7 kg de produit par hectare (0,85 kg IA/hectare) sur le feuillage. Commencer les applications à 10% de floraison et continuer jusqu'à 1 jour avant la récolte (DAAR=1 jour). L'application doit être faite tous les 7 jours ou quand les conditions favorisent le développement de la maladie. NE PAS appliquer plus de 4 fois par année. Applications terrestres seulement. NE PAS appliquer plus de 6,8 kg de produit par hectare par année (3,4 kg IA/hectare/année).

**FRAISES**

De suppression *Botrytis cinerea* (moisissure grise) dans lés fraises, appliquer 1,7 kg de produit par hectare (0,85 kg IA/hectare). Commencer les traitements avant l'apparition de la maladie et pas plus tard que lorsque 10% de floraison, et continuer les traitements à tous les 7 à 14 jours ou lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie. De suppression la moisissure grise et la tache des feuilles, appliquer le fongicide ELEVATE 50 WDG en mélange en réservoir à raison de 1,20 à 1,7 kg de produit par hectare (0,56 à 0,85 kg IA/hectare) avec la dose recommandée de MAESTRO 80 DF. NE PAS faire plus que 4 applications par saison. On peut faire le dernier traitement jusqu'à un jour avant la récolte (DAAR = 1 jour). NE PAS appliquer plus que 6,8 kilogrammes de produit par hectare par année (3,4 kg IA/hectare/année).

## PRÉCAUTIONS
## GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

NE PAS rentrer dans les zones traitées pendant les 4 heures suivant un application. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Laver immédiatement le concentré de sur la peau ou des yeux. Ne pas respirer les émanations. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Après l'usage, se laver les mains et les parties exposées de la peau. Pendant l'usage ne pas manger, boire ou fumer. Retirer et laver séparément les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Éviter la dérive de pulvérisation. Éviter de contaminer les étangs, ruisseaux, rivières et végétation utile. Entreposer le contenant fermé hermétiquement et à l'écart des semences, la nourriture animale, de l'engrais, des plants et de la nourriture. Respecter les zones tampons provinciales appropriées autour des nappes d'eau et terrains marécageux. Porter une chemise à manches longues et un pantalon long pendant toutes les activités. De plus, porter des gants résistant aux produits chimiques pendant le mélange, le chargement, le nettoyage et la réparation de l'équipement.

Si vous prévoyez utiliser le produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux États-Unis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables aux États-Unis, appelez au numéro 1-866-375-4648 ou consultez le site Internet www.cropro.org

## PREMIERS SOINS

Retirer la victime de l'endroit contaminé; enlever ses vêtements contaminés. Garder la victime au chaud, confortable et au repos.

**Contact avec les yeux:** Rincer avec une quantité abondante d'eau. Recourir au médecin si l'irritation persiste.

**Contact avec la peau:** Laver avec une quantité abondante d'eau et du savon. Recourir à des soins médicaux si l'irritation persiste.

**Ingestion:** Appeler un médecin ou un centre antipoison **IMMÉDIATEMENT**. Boire 1 à 2 verres d'eau et faire vomir en insérant un doigt dans le fond de la gorge, ou, si c'est possible, administrer du sirop d'ipéca. Si la victime est inconsciente, ne pas lui administrer quoi que ce soit par la bouche et ne pas faire vomir.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**POUR TOUTE URGENCE MÉDICALE 24 HEURES PAR JOUR, APPELER au 1-800-228-5635, poste 174.**

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** Administrer un traitement symptomatique.

## PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES

Ce produit est toxique pour les poissons et autres organismes aquatiques. Ne pas contaminer les zones aquatiques, notamment les lacs, rivières, bourbiers, étangs, coulées, fondrières des Prairies, ruisseaux, marais, cours d'eau, réservoirs, marécages et habitats marins ou estuariens, par suite de la pulvérisation, du nettoyage de l'équipement et des contenants ou de l'élimination des déchets.
Lorsqu'un mélange en cuve est utilisé, consulter l'étiquette des produits d'association et appliquer la zone tampon la plus grande (la plus restrictive) prévue pour ces produits dans le mélange en cuve.

Épandage avec des pulvérisateurs à jet porté/viticoles:
Ne pas envoyer le jet au-dessus des arbres ou des vignes et désactiver les buses orientées vers l'extérieur pour traiter la fin des rangées ou les rangées extérieures. Ne pas procéder à l'épandage pendant les périodes de calme plat ou lorsque le vent souffle en rafales ou que sa vitesse dépasse 16 km/h au site d'épandage si on la mesure à l'extérieur du verger ou des vignes, du côté situé au vent.

Pour protéger les habitats non ciblés, la pulvérisation ou la dérive vers des habitats écologiquement sensibles doit être évitée. Une zone tampon de 7 m est nécessaire entre le point d'application directe sous le vent et la bordure la plus proche des habitats aquatiques fragiles, tels que lacs, rivières, bourbiers, étangs, coulées, fondrières des Prairies, ruisseaux, marais, cours d'eau, réservoirs et marécages.

## ENTREPOSAGE

Entreposer à la température ambiante. Conserver dans son contenant original. Ne pas entreposer à des températures extrêmes. Pour fermer l'emballage, s'assurer que l'emballage est plié pour obtenir une fermeture hermétique et entreposer au sec. Séparer les insecticides et les fongicides des herbicides pour prévenir la contamination croisée.

## DÉVERSEMENT

Nettoyer immédiatement tout déversement. Placer le produit et tout matériel de nettoyage contaminé dans une poubelle pour déchets chimiques. Laver l'endroit à l'eau et du savon. Absorber le liquide de nettoyage et placer dans un emballage, jetable.

**POUR TOUTE URGENCE CHIMIQUE 24 HEURES PAR JOUR (déversement, fuite, incendie, exposition ou accident), APPELER CHEMTREC au 1-800-424-9300.**

## ÉLIMINATION

Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale. Rendre le contenant inutilisable. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'addresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

## AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi d'un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires.*

## AVIS À L'ACHETEUR

La garantie du vendeur est limitée et soumise aux conditions exprimées sur l'étiquette de sorte que l'acheteur assume les risques corporels ou matériels que l'utilisation ou la manipulation du produit peuvent entraîner et accepte celui-ci à cette condition.

Le Fenhexamide a été inventé et il est produit par Bayer AG, Allemagne

ELEVATE® Marque déposée de Arysta LifeScience North America Corporation
AGRAL® Marque déposée de Syngenta
MAESTRO® Marque déposée de Arysta LifeScience North America Corporation
NOVA® Marque déposée de Rohm and Haas Company, USA

**GROUP/GROUPE 17 FUNGICIDE/FONGICIDE**

# Elevate™ 50 WDG

## Fungicide/Fongicide

**50% Water Dispersible Granule for Use in Water as a Spray for Control of *Botrytis* Diseases of Blackberries, Grapes, Loganberries, Raspberries (Red and Black) and Strawberries**

**Granulés dispersables dans l'eau 50% pour usage dans l'eau comme pulvérisation pour supprimer les maladies causées par le *Botrytis* dans les mûres sauvages (de ronces), le raisin, les mûres de Logan, les framboises rouges et noires, et les fraises**

**Not for Residential Use / Non pour usage résidentiel.**

**AGRICULTURAL / AGRICOLE**

**GUARANTEE / GARANTIE:**

Fenhexamid / Fenhexamide ..... 50%

REGISTRATION NO. 25900 PEST CONTROL PRODUCTS ACT
No D'HOMOLOGATION: 25900 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

**CAUTION**
**AVERTISSEMENT**

**POISON**

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**
**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

**READ THE LABEL BEFORE USING / LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION**

**ARYSTA LIFESCIENCE NORTH AMERICA CORPORATION**
15401 Weston Parkway, Suite 150
Cary, NC 27513
Form 20250-I

EPA Est. No. 065387-AR-002

Arysta LifeScience

Canadian contact:
Zeamax Agriculture
P.O. Box 242
Osgoode ON K0A 2W0

**NET CONTENTS / CONTENU NET: 1kg**

file: 11063-1_bookart created: by customer
folder: 11063-1_IPCO_20250-I alt: 12-18-06 kc
colors: black, pms158, pms281, pms389
size: 3.5" w x 8" h

45197-1_baseart.qxd 12/18/06 10:23 AM Page 1

GROUP/GROUPE **17** FUNGICIDE/FONGICIDE

# Elevate™ 50 WDG

## Fungicide/Fongicide

**50% Water Dispersible Granule for Use in Water as a Spray for Control of *Botrytis* Diseases of Blackberries, Grapes, Loganberries, Raspberries (Red and Black) and Strawberries**

**Granulés dispersables dans l'eau 50% pour usage dans l'eau comme pulvérisation pour supprimer les maladies causées par le *Botrytis* dans les mûres sauvages (de ronces), le raisin, les mûres de Logan, les framboises rouges et noires, et les fraises**

**Not for Residential Use / Non pour usage résidentiel.**

**AGRICULTURAL / AGRICOLE**

**GUARANTEE / GARANTIE:**

Fenhexamid / Fenhexamide . . . . . 50%

REGISTRATION NO. 25900 PEST CONTROL PRODUCTS ACT
No D'HOMOLOGATION: 25900 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

# CAUTION
# AVERTISSEMENT

# POISON

## KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
## GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

**READ THE LABEL BEFORE USING / LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION**

**ARYSTA LIFESCIENCE NORTH AMERICA CORPORATION**
15401 Weston Parkway, Suite 150
Cary, NC 27513
Form 20250-I

EPA Est. No. 065387-AR-002

Arysta LifeScience

Canadian contact:
Zeamax Agriculture
P.O. Box 242
Osgoode ON K0A 2W0

## NET CONTENTS / CONTENU NET: 1kg

file: 45197-1_baseart
folder: 45197-1_IPCO_20250-I
colors: black, pms158, pms281, pms383
size: 4" w x 8" h
created: by customer
alt: 12-18-06 kc